



AMPUTATION AFTER CARE INTRUCTIONS

Your pet has undergone an amputation (removal) of a limb. It is a major surgical procedure.

EXERCISE RESTRICTION: Following surgery, rest/restriction is very important to allow the surgery site time to heal. Your pet should be moderately restricted for the first 10-14 days. This means limited activity outside with no running, jumping or playing.

Depending on nutritional status, weight, concurrent arthritis and overall health, it may take a few days to a few weeks for your pet to become accustomed to having only three legs. At first, it may be necessary to help your pet get off the ground when lying down. Also, depending on how they are doing, you may have to provide assistance/support when walking. During this time period, keep off slippery surfaces, furniture and stairs to prevent injury. The vast majority of animals adapt exceptionally well and get back to normal activity levels.

E-COLLAR: Please *prevent* injury to the incision by keeping the Elizabethan collar on at all times until the sutures/staples are removed.

INCISION: Please evaluate the incision daily for signs of infection including progressive redness, swelling, oozing, heat, pain and/or separation of the skin edges.

SKIN STAPLES/SUTURES: Your pet should have the staples/sutures, the sutures are dissolvable but can be removed post 10-14 days if causing any concern.

MEDICATIONS:

1. Pain Management - Your pet will likely be provided with a Non-Steroidal Anti-Inflammatory/Analgesic Drug (NSAID) such as Rimadyl (carprofen), Deramaxx (deracoxib), Previcox (firocoxib) or Metacam (meloxicam). Carefully follow the instructions listed on the bottle detailing proper dosage and frequency of administration.
2. Antibiotics – Your pet received intravenous antibiotics throughout the surgical procedure and usually will not require extended therapy at home. However, based on individual circumstances, your pet may be prescribed an antibiotic for a limited time period (i.e. Cephalexin, Baytril, Clavamox or Doxycycline) to treat concurrent infection. Please give as directed on the medication label.



Instrucciones para el cuidado posterior a la amputación

Su mascota ha sufrido una amputación (extracción) de una extremidad. Es un procedimiento quirúrgico mayor.

RESTRICCIÓN DE EJERCICIO: Después de la cirugía, el reposo / restricción es muy importante para permitir que el sitio de la cirugía se cure. Su mascota debe estar moderadamente restringida durante los primeros 10 a 14 días. Esto significa actividad limitada al aire libre sin correr, saltar o jugar.

Dependiendo del estado nutricional, el peso, la artritis concurrente y la salud en general, es posible que su mascota tarde de unos días a algunas semanas en acostumbrarse a tener solo tres patas. Al principio, puede ser necesario ayudar a su mascota a levantarse del suelo cuando esté acostada. Además, dependiendo de cómo estén, es posible que deba brindarles ayuda / apoyo al caminar. Durante este período de tiempo, manténgase alejado de las superficies resbaladizas, los muebles y las escaleras para evitar lesiones. La gran mayoría de los animales se adaptan excepcionalmente bien y vuelven a los niveles normales de actividad.

COLLAR ISABELINO: Evite lesionar la incisión manteniendo el collar isabelino puesto en todo momento hasta que se retiren las suturas / grapas.

INCISIÓN: evalúe la incisión diariamente para detectar signos de infección, como enrojecimiento progresivo, hinchazón, supuración, calor, dolor y / o separación de los bordes de la piel.

GRAMPAS / SUTURAS PARA LA PIEL: Su mascota debe tener las grampas/suturas, las suturas son solubles pero se pueden quitar después de 10 a 14 días si le preocupa.

MEDICAMENTOS:

1. **Manejo del dolor** - Es probable que su mascota reciba un medicamento antiinflamatorio / analgésico no esteroideo (AINE) como Rimadyl (carprofeno), Deramaxx (deracoxib), Previcox (firocoxib) o Metacam (meloxicam). Siga cuidadosamente las instrucciones enumeradas en el frasco que detallan la dosis adecuada y la frecuencia de administración.
2. **Antibióticos:** su mascota recibió antibióticos por vía intravenosa durante todo el procedimiento quirúrgico y, por lo general, no necesitará una terapia prolongada en casa. Sin embargo, según las circunstancias individuales, a su mascota se le puede recetar un antibiótico durante un período de tiempo limitado (es decir, cefalexina, Baytril, Clavamox o Doxiciclina) para tratar una infección concurrente. Administre según las instrucciones de la etiqueta del medicamento.