



## Post-Surgery Reminders Please read carefully

Your companion animal may exhibit signs that they are still under anesthesia. This is normal and is dependent on the size, breed and age. It is best if your companion animal is not exposed to a lot of noise and activity. Your companion animal should be wide awake and ambulatory within 24 to 48 hours.

Your companion animal may have a small amount of food and water after going home. However, some do not wish to eat or drink after surgery which is normal. Your companion animal should return to their normal eating and drinking habits within 24 to 48 hours. We use only dissolvable sutures, which usually do not need to be removed and should dissolve within a few weeks or a few months after surgery. **Some bruising and swelling are normal, however excessive vomiting, irritation, swelling, discharge from the incision or an open incision site is never normal and should be addressed immediately by bringing your companion animal to our clinic.**

**\*\* Due to the high volume of calls to our facility, please DO NOT call if you have any concerns, as we maybe not be able to return your call as quickly as needed. If you are having any urgent concerns, please bring your companion animal back to our clinic immediately\*\***

**ABSOLUTELY NO: LICKING, SCRATCHING, SWIMMING, BATHS OR EXCESSIVE ACTIVITY FOR TWO WEEKS.**

### **Recordatorios Posteriores de Cirugía Por favor lea cuidadosamente**

Su animal de compañía puede mostrar signos de que todavía está bajo anestesia. Esto es normal y depende del tamaño, la raza y la edad. Es mejor si su animal de compañía no está expuesto a mucho ruido y actividad. Su animal de compañía debe estar completamente despierto y ambulatorio dentro de las 24 a 48 horas.

Su animal de compañía puede tener una pequeña cantidad de comida y agua después de irse a casa. Sin embargo, algunos no desean comer ni beber después de la cirugía, lo cual es normal.

Su animal de compañía debe volver a sus hábitos normales de alimentación y bebida en un plazo de 24 a 48 horas. Usamos solo suturas solubles, que generalmente no necesitan ser removidas y deben disolverse dentro de unas semanas o meses después de la cirugía. **Poca hinchazón o moretones son normales, sin embargo, los vómitos excesivos, la irritación, la hinchazón, la secreción de la incisión o el sitio de una incisión abierta nunca son normales y deben abordarse de inmediato trayendo su animal de compañía a nuestra clínica.**

**\*\* Debido al alto volumen de llamadas a nuestra clínica veterinaria, NO llame si tiene alguna inquietud, ya que tal vez no podamos devolver su llamada tan rápido como sea necesario. Si tiene alguna inquietud urgente, traiga a su animal de compañía de regreso a nuestra clínica de inmediato \*\***

**ABSOLUTAMENTE NO: LAMBER, RASGAR, NADAR, BAÑOS O ACTIVIDAD EXCESIVA DURANTE DOS SEMANAS.**