



Post-Operative Instructions: Perineal Urethrostomy

Summary:

Thank you for trusting your cat to our surgical care. Your cat has had general anesthesia and surgery for perineal urethrostomy. This is a procedure which involves amputation of the distal urethra and anastomosis to the outside skin. Cats generally do very well after surgery as long as they are not allowed to lick or scratch at the area. Therefore, it is **critical** to maintain the Elizabethan collar until suture removal in two weeks. Please follow the instructions below for your cat's continued care at home.

Recovery Instructions:

1. Activity:

- You will need to keep your cat indoors while his/her incision is healing. This healing phase is typically 14 days. You should keep your cat in an area with a litter box so that you can regularly monitor for urine output.

2. Incision:

- You must not allow your cat to lick, mutilate or attack the incision line. This is critical as these behaviors may compromise the integrity of the surgery. Allowing your cat to damage the incision may require another, potentially less-satisfactory, surgery.
- Under no circumstances should you remove the E-collar prior to suture removal at 2 week post-surgery! Your cat will almost certainly resent the collar for several days but, nonetheless, is perfectly capable of eating, drinking and playing while wearing it.

3. Medications:

- Give all medications as directed and call us if you believe your pet is having an adverse reaction to any of the prescriptions.
- Possible side effects of antibiotics include vomiting, diarrhea and/or decreased appetite. If you observe any of these signs please call us at 303-433-3291, If you can't reach us please bring in your pet.

4. Food:

- Your pet should have access to water at all times and eat his/her normal diet.
- Your pet should be fed multiple smaller meals throughout the day rather than one or two large meals. You should continue this feeding schedule for the remainder of your pet's lifetime.
- Continue providing your pet's normal diet until we communicate something different. If, at the initial surgery, we are successful at retrieving urinary stones, then we will wait for the stone analysis to return in 3-4 weeks to make any further dietary recommendations.
- Your cat may need to be on a special diet the rest of their life.

5. Recovery:

- Please remember that the P.U. surgery does not treat the underlying problem of crystal formation. A P.U. simply enlarges the opening so that subsequent crystal formation no longer results in urethral obstruction. As we discussed, allowing crystals to continue to form will ultimately lead to stone formation. Large stones will not be able to pass through a P.U. site. To prevent further urethral obstruction, we recommend regular recheck urinalyses with your family veterinarian. Ideally the first recheck urinalysis should be performed one month after surgery.

6. Recheck:

- Only if you feel needed – Sutures are dissolvable but if causing issues, we can remove. Most cats require sedation to have these sutures removed so please do not feed him/her the morning of this appointment. There is a small sedation fee of 40 dollars.



Instrucciones posoperatorias: uretrotomía perineal

Resumen:

Gracias por confiar a su gato con nuestro cuidado quirúrgico. Su gato ha tenido anestesia general y cirugía para uretrotomía perineal. Este es un procedimiento que implica la amputación de la uretra distal y anastomosis en la piel exterior. Por lo general, a los gatos les va muy bien después de la cirugía, siempre y cuando no se les permita lamer o rascarse el área. Por lo tanto, es fundamental mantener el collar isabelino hasta que se retire la sutura en dos semanas. Siga las instrucciones a continuación para el cuidado continuo de su gato en casa.

Instrucciones de recuperación:

1. Actividad:

- Deberá mantener a su gato adentro mientras su incisión se cura. Esta fase de curación suele ser de 14 días. Debe mantener a su gato en un área con una caja de arena para que pueda controlar regularmente la producción de orina.

2. Incisión:

- No debes permitir que tu gato lama, mutile o ataque la línea de incisión. Esto es fundamental ya que estos comportamientos pueden comprometer la integridad de la cirugía. Permitir que su gato dañe la incisión puede requerir otra cirugía potencialmente menos satisfactoria.
- Bajo ninguna circunstancia debe quitarse el collar electrónico antes de retirar la sutura 2 semanas después de la cirugía! Es casi seguro que a tu gato le moleste el collar durante varios días, pero, no obstante, es perfectamente capaz de comer, beber y jugar mientras lo lleva puesto.

3. Medicamentos:

- Administre todos los medicamentos según las indicaciones y llámenos si cree que su mascota está teniendo una reacción adversa a cualquiera de las recetas.
- Los posibles efectos secundarios de los antibióticos incluyen vómitos, diarrea y / o disminución del apetito. Si observa alguno de estos signos, llámenos y si no puede contactarnos, traiga a su mascota.

4. Comida:

- Su mascota debe tener acceso al agua en todo momento y comer su dieta normal.
- Su mascota debe alimentarse con varias comidas más pequeñas a lo largo del día en lugar de una o dos comidas grandes. Debe continuar con este horario de alimentación durante el resto de la vida de su mascota.
- Continúe proporcionando la dieta normal de su mascota hasta que le comuniquemos algo diferente. Si, en la cirugía inicial, logramos recuperar los cálculos urinarios, entonces esperamos a que el análisis de los cálculos regrese en 3-4 semanas para hacer más recomendaciones dietéticas.
- Es posible que su gato deba seguir una dieta especial por el resto de su vida.

5. Recuperación:

- Recuerde que la P.U. la cirugía no trata el problema subyacente de la formación de cristales. Una P.U. simplemente agranda la abertura para que la formación de cristales subsiguiente ya no resulte en obstrucción uretral. Como comentamos, permitir que los cristales continúen formándose finalmente conducirá a la formación de cálculos. Las piedras grandes no podrán pasar por una P.U. sitio. Para evitar una mayor obstrucción de la uretra, recomendamos volver a controlar los análisis de orina periódicamente con el veterinario de su familia. Idealmente, el primer análisis de orina de nuevo control debe realizarse un mes después de la cirugía.

6. Examen después de cirugía:

- Solo si lo necesita: las suturas se pueden disolver, pero si causan problemas, podemos eliminarlas. La mayoría de los gatos requieren sedación para que le quiten estas suturas, así que no le dé de comer la mañana de esta cita. Hay una pequeña tarifa de sedación de 40 dólares.